

HO LeafBAC EPS

FERTILIZANTE FOLIAR

Bioestimulante líquido de aplicación foliar formulado a base de pools de microorganismos benéficos vivos, los cuales, de forma directa e indirecta proveen y mejoran la nutrición, calidad y sanidad de los cultivos.

Nuestra exclusiva tecnología microbiológica, transversal a todos los cultivos, brinda excelentes resultados, eficientiza la fertilización nitrogenada de base, reduciendo pérdidas por volatilización y lixiviación; genera además, mayor resistencia al estrés abiótico, aportando una mejora en calidad, sanidad y como consecuente, un incremento en el rendimiento de los cultivos.

Beneficios

Incrementa el rendimiento a través de los diversos mecanismos de acción involucrados en la biofertilización y bioestimulación.

Favorece la biodisponibilidad de micro y macronutrientes en la planta, eficientizando la fertilización de base y generando un balance positivo en los momentos de mayor demanda del cultivo.

Aporta hormonas y factores de crecimiento, resultantes del proceso metabólico microbiano.

Ejerce un efecto fungiestático, inhibiendo el avance de patógenos sobre hojas.



Opcionales a HO-LeafBAC EPS

Fungicida Biológico

HO FungusBAC BS
FUNGICIDA BIOLÓGICO

Fungicida biológico a base de cepas puras de *Bacillus Subtilis*.

Interfiere en la adherencia del patógeno en la planta. Interrumpe el crecimiento del hongo, a través de la producción de toxinas.

Estimula sistema de defensa de la planta, activando una resistencia sistémica.

Actúa como promotor del crecimiento, a través de la liberación de sustancias Bioestimulantes.

Correctores de carencia

Zn | Zinc

Solución a base de zinc. Excelente promotor de crecimiento a través del estímulo en la síntesis de proteínas y hormonas, favorece el cuaje de flores y posee propiedades fungiestáticas.

B | Boro

Solución a base de boro. Brinda mayor rigidez a los tejidos de las plantas. Importante para el cuajado de flores, ya que estimula la formación del tubo polínico.

HO Phyllum
BIOESTIMULANTE

Bioestimulante premium a base de extractos de algas (*Ascophyllum nodosum*), diseñado para potenciar el rendimiento y mejorar la tolerancia a estrés abiótico de los cultivos.

HO LeafBAC^{EPS}

FERTILIZANTE FOLIAR



Insumo apto
producción orgánica
(SENASA 374/16)



Dosis sugerida para cultivos extensivos

Producto/ Cultivos	Soja	Trigo/ Cebada	Maíz/ Sorgo	Girasol	Caña de Azúcar
HO LeafBAC EPS orgánico	2 - 2,4 L/ha <i>Entre V4 a inicio de floración (R1)</i>	2 - 2,4 L/ha <i>Entre inicio de macollaje a macollaje intermedio</i>	2 - 2,4 L/ha <i>Entre 4 y 6 hojas verdaderas</i>	2 - 2,4 L/ha <i>Entre 4 y 6 hojas verdaderas</i>	2,6 - 3,2 L/ha <i>Durante el periodo de macollaje</i>
HO LeafBAC EPS + HO Zinc	2,6 - 3,2 L/ha <i>Entre V4 a inicio de floración (R1)</i>	2,6 - 3,2 L/ha <i>Entre inicio de macollaje a macollaje intermedio</i>	2,6 - 3,2 L/ha <i>Entre 4 y 6 hojas verdaderas</i>	2,6 - 3,2 L/ha <i>Entre 4 y 6 hojas verdaderas</i>	2,6 - 3,2 L/ha <i>Durante el periodo de macollaje</i>
HO LeafBAC EPS + HO Boro	2,5 - 3 L/ha <i>Entre V4 a inicio de floración (R1)</i>		2,5 - 3 L/ha <i>Entre V4 a inicio de floración (R1)</i>	2,5 - 3 L/ha <i>Entre V4 a inicio de floración (R1)</i>	2,5 - 3 L/ha <i>Durante el periodo de macollaje</i>
Opcional BS	0,33 - 0,4 L/ha	0,33 - 0,4 L/ha	0,33 - 0,4 L/ha	0,33 - 0,4 L/ha	0,5 - 0,66 L/ha
Opcional HO Phyllum	1,5 - 3 L/ha	1,5 - 3 L/ha	1,5 - 3 L/ha	1,5 - 3 L/ha	1,5 - 3 L/ha

Se puede combinar la aplicación de HO LeafBAC EPS con el tratamiento de fitosanitarios.
Consultar con su asesor Técnico para aplicación en otros cultivos.

Cultivos de hoja, Repollo, Coliflor, Brócoli, Repollitos de Bruselas

Con 4-6 hojas verdaderas.

Repetir c/20 días hasta cosecha.

Dosis: 2 litros/ha

Sandía, Melón, Zapallo, Zapallito, Pepino

10 días posteriores al transplante. Con guías de 20 cm de long. Repetir c/15 días hasta alcanzar la mitad del tamaño del fruto.

Dosis: 2 - 2,5 litros/ha

Orégano, Romero, Lavanda, Menta, Tomillo

A la salida del invierno cuando comienza a brotar. Luego de c/corte, dejando pasar 7 días.

Dosis: 1 - 2 litros/ha

Olivo, Nogal

En hinchado de yema. Con el cuajado de los frutos. Con el fruto alcanzando un 25% de su tamaño. Cuando finaliza la cosecha y antes de entrar en dormición el árbol.

Dosis: 3 - 5 litros/ha

Papa, Batata

10 días posteriores al aporque del cultivo. Repetir a 20 días de la primera aplicación.

Dosis: 2 litros/ha

Lenteja, Arveja, Garbanzo, Poroto

En prefloración. En inicio de llenado de granos.

Dosis: 3 litros/ha

Tomate

Almácigo: c/ 4-6 hojas verdaderas, 15 días antes del transp. (diluído 10% en agua).

Transplante: a 15 días del transp. Rep. c/15 días procurando coincidir con floración.

Dosis: 2 litros/ha

Espárrago

Durante el desarrollo vegetativo. A 15 días de la anterior. Después de la cosecha.

Dosis: 2 litros/ha

Cítricos

En hinchado de yema. Con el cuajado de los

frutos. Con el fruto al 25% de su tamaño. 30-40 días antes de cosecha.

Dosis: 3 - 5 litros/ha

Pera, Manzana

Aplicación en yema rosada. Al 10% de cuaje del fruto. Al 25% tamaño del fruto. 30-45 días antes de cosecha. Posterior a la cosecha.

Dosis: 3 - 5 litros/ha

Frutilla

A 15 días del transplante. Repetir en c/ floración hasta cosecha.

Dosis: 1,5 litros/ha

Ajo

Con la aparición de la primera hoja verdadera. Repetir c/20 días hasta cosecha.

Dosis: 3 - 4 litros/ha

Durazno, Ciruelo, Damasco

En hinchado de yema. Con el cuajado de los frutos. Con el fruto al 25% de su tamaño. Post cosecha.

Dosis: 3 - 5 litros/ha

Vid

En yema rosada. Al 10% de cuaje de fruto. Al 25% del tamaño del fruto. Post cosecha y antes del amarillamiento y caída de hojas.

Dosis: 3 - 5 litros/ha

Pimiento, Berenjena, Zanahoria, Nabo, Remolacha

Almácigo: c/2 hojas verdaderas, 15 días antes del transplante. C/20 días hasta cosecha.

Dosis: 2 - 2,5 litros/ha

Cebolla, Cebolla de Verdeo

Almácigo: c/2 hojas verdaderas, 15 días antes del transplante.

Transplante: a 15 días del transplante, repetir c/20 días hasta fin de cosecha.

Siembra directa: cuando el cultivo tiene 10 cm de altura, repetir c/20 días hasta cosecha.

Dosis: 3 - 4 litros/ha

Modo de uso

Puede aplicarse solo, a las dosis recomendadas o en combinación con otros productos fitosanitarios debido a su alta compatibilidad con los mismos.

Aplicación terrestre

entre 50 y 120 litros de agua por Ha.

Aplicación aérea

de 5 a 20 lts. por Ha.

pH óptimo de aplicación 5,5 a 6.